

Dermagiq® Skin

Gebruiksaanwijzing

Product
Dermagiq® Skin
30 g / 50 g Huidzalf met honing voor wondbehandeling bij eczeem en andere huidaandoeningen.

Ingrediënten
Arachis oleum, cera alba, glyceryl oleate, mel, aqua, rosa oleum.

Productbeschrijving

Dermagiq® Skin is een goed smeerbare zalf voor de behandeling van oppervlakkige (open) wondjes bij eczeem en andere huidaandoeningen (o.a. roodhuid, jeuk, bij een insectenbeet). Dermagiq® Skin bevat een huidverzorgende basiszalf in combinatie met zuivere honing en kan op grote huidoppervlakken worden toegepast. De honing in Dermagiq® Skin heeft een hoog gehalte aan honingenzymen, o.a. glucose oxidase. In een vochtig milieu produceert het enzym glucose oxidase kleine hoeveelheden waterstofperoxide. Door de hoge suikerconcentratie van de honing mengt een deel van het vocht uit wondjes met Dermagiq® Skin en vormt zo een beschermend laagje dat antibacteriële bescherming biedt. Dermagiq® Skin bevat geen residuen van bestrijdingsmiddelen of conserveringsmiddelen.

Wijze van toepassing

- Schroef het witte dopje van de tube.
- Draai het dopje om.
- Open de tube door de punt van het dopje door de tubeopening te drukken.
- Een laagje Dermagiq® Skin aanbrengen op de te behandelen plaats.
- Dermagiq® Skin licht inmasseren.
- Dermagiq® Skin 10 minuten in laten trekken.
- Indien mogelijk volledig afdekken met een secundair wondverband.
- De aangedane plaats 1 tot 3 maal per dag behandelen.

Indicaties

Dermagiq® Skin kan worden toegepast op oppervlakkige en open wonden bij o.a. eczeem. Dermagiq® Skin kan ook worden toegepast bij huidirritaties, roodheid, jeuk en bescherming van intacte, droge of beschadigde huid. Dermagiq® Skin is geschikt voor alle leeftijden.

Contra indicaties

Gebruik dit product niet indien bekend is dat de patiënt allergisch of overgevoelig is voor een van de ingrediënten. Een allergische reactie of overgevoeligheid kan roodheid, irritatie en mogelijk lichte pijn van de huid of wond veroorzaken.

Bijwerkingen

- In de eerste minuten na het aanbrengen kan het product een licht prikkend gevoel veroorzaken. Het prikkende gevoel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lage pH-waarde en de hoge osmolariteit van de honing. Het is niet van invloed op de werking van het product.
- Mochten zich na gebruik onverwachte bijwerkingen voordoen, neem dan contact op met uw arts of de fabrikant. Bijwerkingen kunnen ongemak voor de patiënt veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken indien de tube beschadigd is. Hierdoor kan het product namelijk verontreinigd raken met bacteriën, wat kan leiden tot wondinfectie. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Plaats na gebruik altijd de dop terug op de tube. Een open tube kan leiden tot verontreiniging met bacteriën en wondinfectie. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Zaet de tube niet in direct contact komen met het wondoppervlak. Direct contact tussen de wond/huid en de (geopende) tube kan leiden tot verontreiniging met bacteriën en wondinfectie. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Dit product niet langer dan 30 dagen achtereen aanbrengen. Behandeling gedurende meer dan 30 dagen achtereen kan leiden tot ongemak voor de patiënt, zoals irritatie en/of lichte pijn.
- Gebruik de inhoud binnen 3 maanden na openen van de tube. Langer gebruik kan leiden tot een minder goede werking en verontreiniging van het product. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Verschillende patiënten niet met dezelfde tube behandelen. Dit kan namelijk leiden tot kruisverontreiniging met bacteriën en wondinfectie. Vanwege de antibacteriële bescherming van honing wordt de kans op wondinfectie zeer gering geacht.
- Gebruik het product niet na de uiterste gebruiksdatum. Dit kan namelijk leiden tot een minder goede werking van het product en ongemak voor de patiënt.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de tube te openen. Dit kan leiden tot het loskomen van stukjes van het afsluitmembraan en tot ongemak bij het gebruik.

Bewaarcondities

Bewaren tussen 4 °C en 30 °C.

Instructions for use

The Product

Dermagiq® Skin
30 g / 50 g cream for the treatment of wounds caused by eczema and other skin disorders

Ingrediens

Arachis oleum, cera alba, glyceryl oleate, mel, aqua, rosa oleum.

Product description

Dermagiq® Skin is an easy to apply ointment for the treatment of superficial open wounds caused by eczema and other skin disorders (including the redness and itching caused by insect bites). Dermagiq® Skin combines a skin-friendly base cream combined with pure honey, and can be used to treat large areas of skin. The honey used in Dermagiq® Skin is rich in honey enzymes, notably glucose oxidase. In a moist environment, glucose oxidase produces small amounts of hydrogen peroxide. Thanks to the high sugar concentration in the honey, some of the moisture from the wound mixes with Dermagiq® Skin to form a protective antibacterial layer. Dermagiq® Skin contains no traces of pesticides or preservatives.

Instructions for use

- Unscrew the white cap from the tube.
- Turn the cap over.
- Open the tube by pressing the tip of the cap through the tube opening.
- Apply a thin layer of Dermagiq® Skin to the areas to be treated.
- Gently massage Dermagiq® Skin.
- Allow 10 minutes for Dermagiq® Skin to be absorbed before covering, if desired, with a gauze or dressing, or with clean, non-irritant clothing.
- Treat the affected area once to three times a day.

Indications

Dermagiq® Skin can be used on superficial and open wounds such as those caused by eczema. Dermagiq® Skin can also be used to soothe skin that is irritated, red, or itchy, or to protect intact, dry, or damaged skin. Dermagiq® Skin is suitable for all ages.

Contra indications

Do not use the product when the patient is known to be sensitive to one of the ingredients of the ointment (see Ingredients). Hypersensitivity to one of the ingredients of the ointment can cause redness, irritation and possibly light pain.

Side effects

- During the first minutes after application, the product can cause a light stinging sensation. The stinging sensation is probably caused by the low pH and high osmolarity of the honey and has no effect on the performance of the product.
- In the event of unexpected side effects after use, contact your doctor or the manufacturer. Side effects can cause inconvenience to the patient.

Safety precautions

- Do not use if the tube is damaged as this can lead to contamination of the product with bacteria and to wound infection. Because of the antibacterial protection that honey provides, the chance of wound infection is considered very low.
- Always replace the top on the tube after use. An open tube could lead to contamination with bacteria and wound infection. Because of the antibacterial protection that honey provides, the chance of wound infection is considered very low.
- Do not allow the tube to come into direct contact with the surface of the wound. Direct contact between the wound/ skin and the uncapped tube could lead to contamination with bacteria and wound infection. Because of the antibacterial protection that honey provides, the chance of wound infection is considered very low.
- Do not apply this product for more than 30 days continuously. Treatment for more than 30 days continuously could lead to inconvenience to the patient, such as irritation and/or minor pain.
- The contents of the tube must be used within 3 months of opening. Longer use could lead to lower functionality and contamination of the product. Because of the antibacterial protection that honey provides, the chance of wound infection is considered very low.
- Do not treat different patients with the same tube as this can lead to cross-contamination with bacteria and to wound infection. Because of the antibacterial protection that honey provides, the chance of wound infection is considered very low.

- Do not use the product after the expiration date as this can lead to lower performance of the product and to inconvenience for the patient.
- Do not use sharp objects to open the tube. This can lead to loosening of pieces of the closing membrane and to inconvenience when using the ointment.

Storing conditions

Store between 4 °C and 30 °C.

Gebruachsanweisung

Produkt

Dermagiq® Skin
30 g / 50 g Salbe zur Behandlung von Wunden sowie bei Ekzem und anderen Hauterkrankungen

Ingredienten

Arachis oleum, cera alba, glyceryl oleate, mel, aqua, rosa oleum.

Produktbeschreibung

Dermagiq® Skin ist eine leicht auftragbare Salbe bestimmt zur Behandlung von oberflächlichen (offenen) Wunden sowie bei Ekzem und anderen Hauterkrankungen (u.a. Rötungen und Juckreiz, beispielsweise bei Insektenstichen). Dermagiq® Skin enthält eine haut-versorgende Basissalbe in Kombination mit reinem Honig und kann auf großen Hautflächen verwendet werden. Dermagiq® Skin enthält Honig mit einem besonders hohen Enzymgehalt, u.a. Glucose Oxidase. Durch die hohe Zuckerkonzentration vom Honig in Dermagiq® Skin vermischt sich ein Teil der Wundflüssigkeit mit Dermagiq® Skin und bildet damit eine antibakterielle Schutzschicht. Der kontrollierte Herstellungsprozess des Honigs garantiert reproduzierbare Qualität und keinerlei Restbestände von Pflanzen- schutzmitteln. Dermagiq® Skin enthält keine Konservierungsstoffe.

Indikationen

Dermagiq® Skin eignet sich zur Behandlung von oberflächlichen und offenen Wunden sowie bei Ekzem. Dermagiq® Skin kann auch bei Hautreizungen oder -rötungen, bei Juckreiz oder zum Schutz von intakter, trockener oder beschädigter Haut verwendet werden. Dermagiq® Skin eignet sich für alle Altersgruppen.

Anwendungsweise

- Drehen Sie den weißen Verschluss von der Tube ab.
- Drehen Sie den Verschluss um.
- Öffnen Sie die Tube, indem Sie mit der Spitze des Verschlusses durch die Tubenöffnung stechen.
- Tragen Sie eine dünne Schicht Dermagiq® Skin auf die zu behandelnde Stelle auf.
- Dermagiq® Skin leicht einreiben.
- Lassen Sie die Dermagiq® Skin 10 Minuten einziehen und danach ggf. mit einem Wundverband oder mit sauberer, reizfreier Kleidung abdecken.
- Die befallene Stelle 1 bis 3-mal täglich behandeln.

Kontraindikationen

Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn der Patient gegen einen der Bestandteile der Salbe empfindlich ist (s. Bestandteile). Eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber einem Bestandteil der Salbe kann zu Rötungen oder Reizungen und möglicherweise zu leichter Schmerzempfindung führen.

Nebenwirkungen

- In den ersten Minuten nach dem Auftragen kann das Produkt ein leicht stechendes Gefühl hervorrufen. Dieses stechende Gefühl wird wahrscheinlich von dem niedrigen pH-Wert und der hohen osmotischen Konzentration des Honigs hervorgerufen und wirkt sich nicht auf die Wirksamkeit des Produkts aus.
- Bei unerwarteten Nebenwirkungen nach der Anwendung nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt oder mit dem Hersteller auf. Nebenwirkungen können für den Patienten unangenehm sein.

Vorsorgemaßnahmen

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Tube beschädigt ist, da dies zu einer bakteriellen Verunreinigung des Produkts und zu Wundinfektionen führen kann. Aufgrund der antibakteriellen Wirkung des Honigs ist von einem sehr geringen Risiko der Wundinfektion auszugehen.
- Nach der Verwendung muss die Tube ausnahmslos wieder verschlossen werden. Eine unverschlossene Tube kann zu einer bakteriellen Verunreinigung und Wundinfektion führen. Aufgrund der antibakteriellen Wirkung des Honigs ist von einem sehr geringen Risiko der Wundinfektion auszugehen.
- Die Tube darf auf keinen Fall direkt mit der Wundoberfläche in Berührung kommen. Ein direkter Kontakt zwischen der Wunde/Haut und der (geöffneten) Tube kann zu einer bakteriellen Verunreinigung und Wundinfektion führen. Aufgrund der antibakteriellen Wirkung des Honigs ist von einem sehr geringen Risiko der Wundinfektion auszugehen.
- Das Produkt darf auf keinen Fall länger als 30 Tage ununterbrochen verwendet werden. Bei einer ununterbrochenen Behandlung von mehr als 30 Tagen können für den Patienten unangenehme Begleiterscheinungen wie Reizungen und/oder leichte Schmerzempfindung auftreten.
- Der Inhalt muss innerhalb von 3 Monaten nach Öffnung der Tube verbraucht werden. Eine längere Verwendung kann zu verschlechterter Wirksamkeit und zu Verunreinigung des Produkts führen. Aufgrund der antibakteriellen Wirkung des Honigs ist von einem sehr geringen Risiko der Wundinfektion auszugehen.
- Es dürfen auf keinen Fall mehrere Patienten mit derselben Tube behandelt werden, da dies zu Kreuzkontaminationen mit Bakterien und Wundinfektion führen kann. Aufgrund der antibakteriellen Wirkung des Honigs ist von einem sehr geringen Risiko der Wundinfektion auszugehen.
- Das Produkt darf auf keinen Fall nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwendet werden, da dies zu verringerter Wirksamkeit des Produkts und unangenehmen Begleiterscheinungen für den Patienten führen kann.
- Öffnen Sie die Tube auf keinen Fall mit scharfen Gegenständen. Das kann dazu führen, dass sich Stücke der Verschlussmembrane lösen oder die Anwendung erschwert wird.

Aufbewahrung

Aufbewahrung bei 4 °C - 30 °C.

Mode d'emploi

Produit

Dermagiq® Skin
30 g / 50 g de crème pour le traitement des plaies superficielles en cas d'eczéma et autres problèmes de peau

Ingédients

Arachis oleum, cera alba, glyceryl oleate, mel, aqua, rosa oleum.

Description du produit

La crème Dermagiq® Skin est une crème facile à étaler et convient au traitement des plaies superficielles (ouvertes) en cas d'eczéma et autres affections cutanées (rougeurs, démangeaisons, piqûres d'insectes, etc.). L'onguent Dermagiq® Skin comprend une crème de base de soin de la peau et du miel médicinal pur et peut être appliqué sur de grandes surfaces cutanées. Le miel de la crème Dermagiq® Skin présente une forte teneur en enzymes, dont la glucose oxydase. En milieu humide, la glucose oxydase produit de petites quantités de peroxyde d'oxygène. Grâce à la forte concentration en sucre du miel, une partie de l'humidité des plaies se mélange à la crème Dermagiq® Skin et forme ainsi une couche de protection antibactérienne. La crème Dermagiq® Skin ne contient pas de résidus de pesticides, insecticides ou agents de conservation.

Application

- Dévissez le bouchon blanc du tube.
- Retournez le bouchon.
- Ouvrez le tube en appuyant la pointe du bouchon dans l'ouverture du tube.
- Appliquez une couche de la crème Dermagiq® Skin sur la partie à traiter.
- Faire pénétrer la crème Dermagiq® Skin par massage doux.
- Laisser à l'air libre les aires traitées environ 10 minutes. Si on le souhaite, on peut alors couvrir la blessure avec de la gaze ou un tissu non irritant.
- Traiter 1 à 3 fois par jour la partie affectée.

Indications

La crème Dermagiq® Skin peut être utilisé sur des plaies superficielles et ouvertes, ainsi qu'en cas d'eczéma. La crème Dermagiq® Skin convient à tous les âges.

Contre-indications

Ne pas utiliser le produit si le patient est sensible à l'un des ingrédients de l'onguent (voir Ingrédients). La forte sensibilité à l'un des ingrédients de l'onguent peut entraîner des rougeurs, une irritation et éventuellement une légère douleur.

Effets secondaires

- Pendant les premières minutes suivant l'application, le produit peut entraîner une légère sensation de picotement. Celle-ci est probablement due au faible pH et à la haute osmolarité du miel et n'a aucun effet sur l'efficacité du produit.
- En cas d'effets secondaires inattendus après utilisation, veuillez consulter votre médecin ou le fabricant. Ses effets secondaires peuvent occasionner des désagréments pour le patient.

Précautions de sécurité

- Ne pas utiliser si le tube est endommagé car cela peut entraîner une contamination du produit avec des bactéries et une infection de la plaie. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.

- Toujours replacer le bouchon sur le tube après utilisation. Un tube ouvert pourrait entraîner une contamination avec des bactéries et une infection de la plaie. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Veiller à ce que le tube n'entre pas directement en contact avec la surface de la plaie. Le contact direct entre la plaie/peau et le tube (ouvert) pourrait entraîner une contamination avec des bactéries et une infection de la plaie. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Ne pas utiliser ce produit plus de 30 jours de suite. Le traitement pendant plus de 30 jours de suite pourrait entraîner des désagréments pour le patient, comme une irritation et/ou une légère douleur.
- Utiliser le contenu sous 3 mois après l'ouverture du tube. Une utilisation plus longue pourrait entraîner une moindre efficacité et une contamination du produit. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Ne pas traiter différents patients avec le même tube, car cela peut entraîner une contamination croisée avec des bactéries et une infection de la plaie. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Ne pas utiliser le produit après expiration de la date car cela peut entraîner une moindre efficacité du produit et des désagréments pour le patient.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour ouvrir le tube, car des morceaux du film protecteur pourraient se détacher et provoquer une gêne pendant l'utilisation du produit.

Conditions de stockage

A conserver entre 4 °C et 30 °C.

Foglietto illustrativo

Forma farmaceutica e contenuto della confezione

Dermagiq® Skin, 30 g / 50 g di crema per il trattamento di lesioni cutanee superficiali in presenza di eczema

Ingredienti

Arachis oleum, cera alba, glyceryl oleate, mel, aqua, rosa oleum.

Indicazioni terapeutiche e proprietà farmacologiche

La crema Dermagiq® skin è una pomata con ottime doti di spalmabilità per il trattamento di lesioni superficiali, fra cui quelle che si formano sulla pelle irritata dall'eczema a seguito di ferite e graffi provocate dal continuo grattamento delle parti pruriginose. La crema Dermagiq® Skin contiene una crema base a cui è stato aggiunto miele puro ed è idonea al trattamento di vaste aree epidermiche. Il miele usato in la crema Dermagiq® Skin possiede un elevato tenore di enzimi, fra cui la glucosio ossidasi. In un ambiente umido l'enzima glucosio ossidasi genera piccole quantità di perossido di idrogeno. Grazie all'elevata concentrazione dello zucchero presente nel miele la crema Dermagiq® Skin entra in sintesi con la secrezione della ferita e forma una barriera con azione antisettica ed antibatterica. La crema Dermagiq® Skin non contiene residui di anticrittogamici o conservanti.

Dose, modo e tempo di somministrazione

- Svitare il tappo bianco dal tubo.
- Capovolgere il tappo.
- Per aprire il tubo premere la punta del tappo sull'apertura del tubo stesso.
- Applicare la crema Dermagiq® skin sulle ferite e sulla pelle lesa.
- Massaggiare lievemente per favorire l'assorbimento del preparato.
- Lasciare agire la pomata per una decina di minuti e, se necessario, coprire la ferita con un bendaggio o con indumenti puliti e non irritanti, per esempio di seta.
- Applicare la medicazione 1-3 volte al giorno sulla zona interessata.

Indicazioni

La crema Dermagiq® skin è indicata per il trattamento di ferite superficiali e anche in presenza di eczema. La crema Dermagiq® Skin trova applicazione anche nella protezione della pelle intatta, secca o ruvida. La crema Dermagiq® Skin è adatto a tutte le eta.

Controindicazioni

Non usare il prodotto se il paziente ha un'ipersensibilità nota a uno degli ingredienti della pomata (fare riferimento agli ingredienti). Un'elevata sensibilità a uno degli ingredienti della pomata può provocare rossore, irritazione e, possibilmente, un leggero dolore.

Effetti indesiderati

- Durante i primi minuti dopo l'applicazione, il prodotto può provocare una leggera sensazione di bruciore. La sensazione di bruciore è probabilmente causata dal basso pH e dall'elevata osmolarità del miele e non ha alcun effetto sull'efficacia del prodotto.
- In caso di effetti collaterali imprevisti dopo l'uso, rivolgersi al proprio medico o al produttore. Gli effetti collaterali possono provocare disagio al paziente.

Precauzioni per l'uso

- Non usare se il tubetto è danneggiato perché questo può portare alla contaminazione del prodotto con batteri e all'infezione della ferita. Data la protezione antibatterica del miele, la probabilità di infezione della ferita è considerata molto bassa.
- Dopo l'uso richiudere sempre il tubetto. Un tubetto aperto potrebbe portare alla contaminazione con batteri e a un'infezione della ferita. Data la protezione antibatterica del miele, la probabilità di infezione della ferita è considerata molto bassa.
- Il tubetto non deve venire a contatto diretto con la superficie della ferita. Il contatto diretto fra la ferita/pelle e il tubetto (aperto) potrebbe portare alla contaminazione con batteri e a un'infezione della ferita. Data la protezione antibatterica del miele, la probabilità di infezione della ferita è considerata molto bassa.
- Non applicare questo prodotto ininterrottamente per più di 30 giorni. Il trattamento ininterrotto per più di 30 giorni può portare a disagi per il paziente, come irritazione e/o leggero dolore.
- Usare il contenuto entro 3 mesi dall'apertura del tubetto. Un uso prolungato potrebbe comportare una minore funzionalità e la contaminazione del prodotto. Data la protezione antibatterica del miele, la probabilità di infezione della ferita è considerata molto bassa.
- Non trattare diversi pazienti con lo stesso tubetto perché questo potrebbe portare alla contaminazione con batteri e a un'infezione della ferita. Data la protezione antibatterica del miele, la probabilità di infezione della ferita è considerata molto bassa.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza perché questo può compromettere l'efficacia del prodotto e provocare disagio al paziente.
- Non usare oggetti affilati per aprire il tubo perché potrebbe provocare il distacco di pezzetti della membrana di chiusura e inconvenienti nell'uso della pomata.

Conservazione

Conservare a 4 °C - 30 °C.

Käyttöohje

Tuote

Dermagiq® Skin
30 g / 50 g voidetta ihottumasta ja muista iho-oireista johtuviin haavaumiin

Valmistusaineet

Maapähkinäöljy, mehiläisvaha, glyceryl oleate (pehmentävä aine), hunaja, tislattu vesi, rosa oleum.

Tuotekuvaus

Dermagiq® Skin on hyvin levittyvä voide ihottumasta ja muista iho-oireista (esim. eryteema, kutina, hyönteisten puremat) johtuviin (avoimin) pintahaavoihin. Dermagiq® Skin sisältää ihoa hoitavaa perusvoidetta ja puhdasta hunajaa, ja se soveltuu käytettäväksi suuriinkin ihoalueille. Dermagiq® Skin voiteessa käytettävä hunaja sisältää runsaasti hunajaentsyymejä, mm. glukooksidiaasia. Kosteassa ympäristössä glukooksidiaasi-entsyymi muodostaa pieniä pitoisuuksia vetyperoksidia. Hunajan korkean sokeripitoisuuden ansiosta osa haavanesteestä imeytyy Dermagiq® Skin voiteeseen muodostaen iholle suojakerroksen, joka estää bakteerien pääsyä haavaan. Dermagiq® Skin ei sisällä jäämiä torjunta- tai säilöntäaineista.

Käyttö

- Kierrä tuubin valkoinen korkki irti.
- Käännä korkki ympäri.
- Avaa tuubi painamalla korkin kärki tuubin suun läpi.
- Levitä kerros Dermagiq® Skin voidetta hoidettavalle ihoalueelle.
- Hiero Dermagiq® Skin kevyesti ihoon.
- Anna Dermagiq® Skin voiteen imeytyä 10 minuutin ajan, minkä jälkeen sen voi peittää haavasiteellä tai puhtaalla vaateella, jonka kangas ei ärsytä ihoa.
- Käsittele vahingoittunutta ihokohtaa voiteella 1–3 kertaa päivässä.

Käyttöaiheet

Dermagiq® Skin voidetta voidaan käyttää sekä pinnallisin haavoihin että avohaavoihin, jotka johtuvat esim. ihottumasta. Dermagiq® Skin soveltuu myös ärtyneelle, punoittavalle tai kutisevalle iholle sekä suojaamaan ehjää kuivaa ihoa tai vahingoittunutta ihoa. Dermagiq® Skin soveltuu kaikenikäisille.

Vasta-aiheet

Tuotetta ei saa käyttää, jos potilaan tiedetään olevan yliherkkä jollekin voiteen ainesosista (katso ainesosat). Yliherkkyys jollekin voiteen ainesosista saattaa aiheuttaa punoitusta, ärsytystä ja mahdollisesti lievää kipua.

Haittavaikutukset

- Ensimmäisten minuuttien aikana tuotteen levityksen jälkeen iholla saattaa

